Tierseuchen erkennen und vorbeugen am Beispiel MKS und Blauzungenkrankheit

R. Pützschel RGD TSK Sachsen
Treffpunkt RGD 2.04.2025

MKS

BT

BVD/MD

BKF OHV2

Lumpy skin

Stomatitis
papulosa

Bovine Mammilitis BHV2

IBR BHV1

Kälberdiphtheroid

Rinderpest

Dermatitis digitalis

Stomatitis vesicularis

Photodermatitis

- Verletzungen
- Verbrennungen
- Verätzungen

Johanniskrautvergiftung

MKS-Ausbruch in Brandenburg im Januar 2025

Ausbruch 10.01.2025
Hönow, Brandenburg
Wasserbüffel

MKS-Ausbruch in Ungarn und der Slowakei im März 2025

- Am 7. März 2025 Ausbruch der MKS in **Ungarn**
- Am 21. März 2025 im Süden der **Slowakei** bestätigt. Ein weiterer Fall kam am 25. März dazu.
- Am 26. März 2025 zweiter Ausbruch in Ungarn
- Insgesamt mehrere 1000 Rinder betroffen

- Tötung der Tiere
- Notimpfung mit nachfolgender Tötung
- Virusstamm O, wie in BB, aber andere Typ (Pakistan)
- Eintrag von Ungarn in die Slowakai über Sturmweatherlage
- Überwachungszonen in Österreich (1100 Betriebe mit 82.000 empfänglichen Tieren)

Zonen Maul- und Klauenseuche

Stand 26.03.2025

- Überwachungszone
- Weitere Sperrzone

Foot and mouth disease

26.03.2025.

Ref. Ares(2025)2488871 - 27/03/2025

82.000 empf. Tiere in
1100 Haltungen

43 empfängliche Tiere
in 11 Haltungen

UPDATE 01.04.2025

- 30.03.25
- 5. Ausbruch in der Slowakai
- 3500 betroffene Rinder
- 10 km von österreichischen Grenze entfernt

- **letzter Ausbruch der MKS in Deutschland 1988 in Niedersachsen**
- **In der EU 2011 in Bulgarien**
- **2001 Vereinigte Königreich, Frankreich, Irland, Niederlande**
- **2007 nochmals GB**

2001 durch die Verfütterung nicht erhitzter Speiseabfälle in einen Schweinebetrieb eingeschleppt.

Auswirkungen:

- Über 6,5 Millionen Tiere mussten getötet werden
- Der volkswirtschaftliche Schaden wurde auf über 12 Milliarden Euro geschätzt

Weltweites Vorkommen der MKS, basierend auf Daten der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE)

Grün – durch die OIE anerkannt als MKS-frei ohne Impfung

Hellgrün – durch die OIE anerkannt als MKS-frei mit Impfung

Rot – kein offizieller Status, MKS tritt sporadisch auf oder ist enzootisch

Grau – kein offizieller Status, zurzeit aber vermutlich MKS-frei

(Stand Juni 2020)

BHV1

BVD

LUFT

MKS

T\$K
SÄCHSISCHE
TIERSEUCHENKASSE
ANSTALT
DES ÖFFENTLICHEN
RECHTS

Desinfektion

pH-Wert-Toleranz

Das Virus überlebt in einem neutralen bis leicht sauren **pH-Bereich (pH 6–9)**

Das Virus der MKS(FMDV) ist ein **unbehülltes RNA-Virus** aus der Familie der **Picornaviridae** und kann durch geeignete chemische Substanzen inaktiviert werden.

Empfohlene Desinfektionsmittel für MKS (Auswahl):

1. Alkalische Lösungen:

- Natriumhydroxid (Kali-Lauge, Ätznatron, 2 % Lösung):
- Natriumcarbonat (Soda, 4 % Lösung):

2. Säuren:

- Zitronensäure (1–2 % Lösung):
- Essigsäure (2 % Lösung):

Produkt-name	Hersteller/ Vertreiber ¹	Wirkstoffe	Temperatur °C	Einwirkzeit min	Gebrauchskonzentration in Volumen-Prozent (V-%) bzw. g/100ml									
					Bakterizide				Levurozide Fungizide		Viruszide		Antiparasitäre Wirkung	
					Speziell Desinfekt ¹	Vollspektrum Desinfektion ²	Mykobakterien (Tuberkulose)	Bakterielle Sporen (Sporenzide)	Hefezide (Levurozide) ³	Hefezide auf Schimmelpilze ⁴ (Fungizide)	Unbehüllte Viren (Viruszide) ⁵	Behüllte Viren (logreduzierte Viruszide) ⁶	Parasitäre Würmer (Wurmer) ⁷	Parasitäre Einzeller ⁸
1	2	3			4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b
1+1 Wofasteril® SC super	KESLA PHARMA WOLFFEN GMBH	Sauerstoffabspalter Hersteller: Jung Flensburger (a) gepuffert auf pH 8,5-9,5 mit Alkohollösung (b)	-10	30	0,75a + 0,75b							1a + 1b		
				60								0,5a + 0,5b		
	Kristall 1 D-06803 Lieferfeld-Wolfen	Hinewik 2-Komponentenprodukt aus Komponenten a und b. Die Herstellerangaben zum Anmischen der Gebrauchslösung sind zu beachten	10	30	0,75a + 0,75b	0,5a + 0,5b	2a + 2b		0,75a + 0,75b		1,5a + 1,5b		0,5a + 0,5b	
				60	0,5a + 0,5b							0,25a + 0,25b		
			20	30								0,5a + 0,5b		
				60								0,5a + 0,5b		
				120			1a + 1b							

- Proteinfehler !
- Konzentration und Kontaktzeit !
- Sicherheit: Desinfektionsmittel (z. B. Natriumhydroxid) sind stark ätzend oder giftig

Desinfektion

Für eine wirksame Desinfektion ist im Regelfall der Einsatz von 0,4 l Gebrauchslösung pro m ² Oberfläche notwendig					Gebrauchskonzentration in Volumen-Prozent (V-%) bzw. g/100ml									
Produkt-name	Hersteller/ Vertreiber *	Wirkstoffe	Temperatur °C	Einwirkzeit min	Bakterizidie				Levurozidie Fungizidie		Viruzidie		Antiparasitäre Wirkung	
					Spezielle Desinfektion ¹	Vorbeugende Desinfektion ²	Mykobakterien (Tuberkulozidie)	Bakterielle Sporen (Sporizidie)	Hefepilze (Levurozidie) ³	Hefepilze und Schimmelpilze ⁴ (Fungizidie)	Unbehüllte Viren (Viruzidie) ⁵	Behüllte Viren (begrenzte Viruzidie) ⁶	Parasitäre Würmer (Wurmeier) ⁷	Parasitäre Einzeller ⁸
1	2	3			4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b
1+1 Wofasteril® SC super	KESLA PHARMA WOLFEN GMBH Keslastr. 1 D-06803 Bitterfeld-Wolfen	Sauerstoffabspalter Hersteller-Ang.: Peressigsäure (a), gepuffert auf pH 8,5-9,5 mit alcapur® (b). Hinweis: 2-Komponentenprodukt aus Komponente a und b. Die Herstellerangaben zum Anmischen der Gebrauchslösung sind zu beachten.	-10	30		0,75a + 0,75b						1a + 1b		
				60							0,5a + 0,5b			
			10	30	0,75a + 0,75b	0,5a + 0,5b	2a + 2b		0,75a + 0,75b	1,5a + 1,5b	0,5a + 0,5b			
				60	0,5a + 0,5b						0,25a + 0,25b			
			20	30							0,5a + 0,5b			
				60							0,5a + 0,5b			
			120				1a + 1b							

T\$K

SÄCHSISCHE
TIERSEUCHENKASSE
ANSTALT
DES ÖFFENTLICHEN
RECHTS

BIOSICHERHEIT

BIOSICHERHEIT

EINFRIEDUNG

ABSCHLIESSBARES TOR

SEUCHENWANNE

P

BESUCHERPARKPLATZ

UMKLEIDERAUM
SCHWARZ/WEISS DUSCHEN

BESUCHERKLEIDUNG/STIEFEL

WILDTIERE

HAUSTIERE

TAUCHWANNEN

SCHADNAGER

T\$K

SÄCHSISCHE
TIERSEUCHENKASSE
ANSTALT
DES ÖFFENTLICHEN
RECHTS

TIERHALTUNG MITARBEITER

QUARANTÄNE - KRANKENBOX

TIERKÖRPERBESEITIGUNG

VIEHHÄNDLER / FM-HÄNDLER

BIOSICHERHEIT

In der Mutterkuh- Weidehaltung

**Stabile wilddichte Zäune
(Doppelzaun?)**

**Keine gemeinsamen
Tränken mit Wildtieren**

**Saubere Tränksysteme
regelm. R/D**

**Kontakt mit
Nachbarweiden
verhindern**

**Verendet Tiere sofort
entfernen**

**Tiere regelmäßig
kontrollieren**

**Kein Restfutter oder
potentiell kontaminiertes
Futter auf die Weide
bringen**

**Quarantäne
21 Tage**

Kriterium	Blauzungenkrankheit	Maul- und Klauenseuche
Erreger	Bluetongue-Virus (BTV), ein Orbivirus	Maul- und Klauenseuche-Virus (FMDV), ein Aphthovirus
Wirtsspektrum	Wiederkäuer (v. a. Schafe, Rinder und Ziegen)	Paarhufer (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildtiere)
Übertragungsweg	Über Mücken (v. a. Gnitzen der Gattung Culicoides)	Direkter Kontakt, Aerosole, kontaminierte Materialien
Geografische Verbreitung	Tropische, subtropische und zunehmend gemäßigte Zonen	Weltweit, häufig in endemischen oder epidemischen Ausbrüchen
Klinische Symptome	Fieber, Schwellung der Lippen, Zunge, und Kronsaum, Zyanose ("Blaue Zunge")	Fieber, Bläschen an Maul, Klauen, und Euter, Lahmheit
Sterblichkeitsrate	Variabel, bei Schafen höher (bis 70 %), bei Rindern niedriger	Niedrig 1-2 %, aber hohe wirtschaftliche Schäden (bis 100% Erkrankung)
Wirtschaftliche Schäden	Milchverlust, Wachstumsverzögerung, Tierverluste	Produktionsverluste, Handelsrestriktionen, Massenkeulungen
Zoonosegefahr	Keine	Sehr gering, kaum gefährlich für Menschen
Inkubationszeit	4 - 10	2 -14
Bekämpfung	Impfstoffe, Vektorkontrolle (Mückenbekämpfung)	Impfstoffe, Quarantäne, Keulung
Kreuzimmunität innerhalb der Stämme	Nein	Nein
Schutzmaßnahmen	Schutzimpfungen, Mückenbekämpfung	Impfungen, Hygienemaßnahmen, strikte Handelsregeln

2006

2008

2013

2017

2019

Bluetongue

Restricted zones* as of 15 January 2019

This map includes information on the bluetongue virus serotypes circulating in each restricted zone, which permits, for the purposes of Articles 7 and 8 of Regulation No 1266/2007, the identification of the restricted zones demarcated in different Member States where the same bluetongue virus serotypes are circulating.

Zone (serotypes)

- F (8)
- G (1,2,4,16)
- I (1,4)
- J (1)
- T (1,2,4,8,16)
- X (4,16)
- Y (8,4)
- A3 (4)
- A4 (1,4,8,16)
- A5 (1,3,4,16)
- A6 (1,4,16)
- A7 (4,16,8)
- A8 (16)

* as defined in Article 2 (d) of Commission Regulation No 1266/2007: geographic areas where surveillance and/or protection zones have been demarcated by the Member States in accordance with Article 8 of Council Directive 2000/75/EC.

For information purposes only. The European Commission does not assume any liability resulting from its content.

2023

September 2023: ein neuer Serotyp beginnt sich von den Niederlanden in Europa auszubreiten

Vorher bekannt aus: Süditalien, Tunesien, Israel, südliches Afrika

2024

- **Nächste Tierseuche unterwegs...**
 - **EHD (Epizootische hämorrhagische Krankheit)**
- Virus und Symptomatik sehr ähnlich zu Blauzunge
- Vor allem Hirsch- und Antilopenarten empfänglich aber auch Hauswiederkäuer
- 2022 in Italien, Spanien bei Rindern
- Zuletzt vermehrt Fälle in Frankreich (1200 Fälle bis Ende Oktober 24), Spanien, Portugal
- Impfung in Belgien schon verpflichtend für 2025

BTV-Situation in Österreich

- ✓ Mitte September 24: erste Fälle von BTV3 und BTV4
- ✓ 07.01.25: **224x BTV3; 76x BTV4**; 1x Doppelinfektion; 18x noch nicht typisiert)

Blauzungenkrankheit: untersuchte Betriebe (negativ) und bestätigte Ausbrüche

Untersuchte Betriebe zwischen dem 01.09.2024 und dem 07.01.2025 (Auftrag)

Ergebnis

- ◇ negativ
- positiv BTV-3
- positiv BTV-4
- positiv BTV-3, BTV-4
- positiv, noch nicht typisiert

0 10 20 50 100 km

BTV-Situation in der Schweiz

- ✓ 27.08.2024: erster Fall von BTV8 bestätigt (20.12.24 = **218 Fälle**)
- ✓ 28.08.2024: erster Fall von BTV3 bestätigt (20.12.24 = **1835 Fälle**)

Übersicht Fallzahlen Blauzungenkrankheit

Anzahl der Tierhaltungen (nicht die Anzahl der Tiere) pro Kanton und pro Serotyp, die von der Blauzungenkrankheit betroffen sind seit 28.08.2024.

Tierart	BTV-3	BTV-8	Total
Anderes Haustier	3	0	3
Anderes Wildtier	0	1	1
Rind	1'062	164	1'226
Schaf	759	51	810
Ziege	11	2	13
Total	1'835	218	2'053

Datensatz: Blauzungenkrankheit Ausbruch 2024 - Zusammenfassung, Neuestes
Datensupdate: 20.12.2024 10:08

Erstellt mit visualize.admin.ch

**Bisher kein
EHDV8!**

Bluetonguefälle in der Schweiz seit 28.8.24
Cas de Bluetongue en Suisse depuis 28.8.24
Casi di Bluetongue in Svizzera da 28.8.24
Cases of Bluetongue in Switzerland since 28.8.24

■ BTV-8
■ BTV-3

Federal Office of Topography swisstopo

BLV / USAV / OSAV / FSVO, 20.12.2024 - mbl

BTV8

- Die **Blauzungkrankheit** (englisch *Bluetongue*) ist eine durch Gnitzen übertragene virale Infektionskrankheit von Wiederkäuern wie Schafen, Rindern, Ziegen und Kamelartigen
- **Gnitzen:**
 - 0,5-3 mm; 300 Arten in D., Weibchen saugen Blut
 - Optimum für Virusvermehrung 25 – 30 Grad C
 - Gnitzen überleben 3 Monate bei 10 Grad C
 - Bei unter 12 Grad C sinkt Aktivität, aktiv bis 5 (0) Grad C
 - Transport über Wind (bis 200 km /Tag, 20 km/Woche)
 - Virus bis **70 Tage im Blut von Tieren** – bis 200 Tage DNA nachweisbar
 - Antikörper 7 – 10 Tage nach Infektion
 - Überwinterung !?

Diagnostische Nachweise - klassische BTV (Serotypen 1-24)

In erstmalig BTV-infizierten Tieren sind bis zu 6 Monate sowohl Virusgenome als auch BTV-Antikörper nachweisbar.

BHV1

BVD

T\$K

SÄCHSISCHE
TIERSEUCHENKASSE
ANSTALT
DES ÖFFENTLICHEN
RECHTS

MKS

LUFT

BTV3

T\$K

SÄCHSISCHE
TIERSEUCHENKASSE
ANSTALT
DES ÖFFENTLICHEN
RECHTS

Different modes of BTV transmission

Saminathan M, Singh KP, Khorajiya JH, Dinesh M, Vineetha S, Maity M, Rahman AF, Misri J, Malik YS, Gupta VK, Singh RK, Dhama K. An updated review on bluetongue virus: epidemiology, pathobiology, and advances in diagnosis and control with special reference to India. Vet Q. 2020 Dec;40(1):258-321. doi: 10.1080/01652176.2020.1831708. PMID: 33003985; PMCID: PMC7655031.

Weitere Übertragungsmöglichkeiten

Feststellungen BTV3 in D
17.400

Feststellungen BTV3 in D und SN

Verbreitung BTV3 SN

17.08.24

26.08.24

04.09.24

01.10.24

03.12.24

17.01.2025

Klinische Symptome beim Rind

Inkubationszeit 7 Tage (4-20 Tage)

Kühe/Färsen:

- Allgemeinstörungen (Fieber, Fressunlust, geringere Aktivität, Wachstumsunterbrechung bei Färsen)
- Milchdepression
- Lahmheiten, Gliedmaßenschwellungen
- Fortpflanzungsstörungen:
 - Früh- Spätaborte
 - Zysten
- Erhöhte Mastitisrate
- Sekundäre Infektionen (Pneumonien)
- Erhöhte Verendungsrate

Klinische Symptome beim Rind

Kälber:

- zu kleine Kälber
- ZNS-Störungen - von leichten Koordinationsstörungen über Zwangswandern
- Unruhe, bis zu fehlender Stehfähigkeit, fehlender Saugreflex, Krämpfe bzw epileptische Anfälle, Opisthotonus (Kopfüberstreckung)
- Augenveränderungen – Exophthalmus (Hervortreten), seröser Ausfluss, eitrige Entzündungen mit Erblindung durch Hornhauttrübung, angeborene Blindheit durch trüben Glaskörper
- gedrungene/dicke Kopfform

Fruchtbarkeitsstörungen

Auswirkungen Blauzungen-Infektion auf Besamungszahlen im MASTERRIND-Gebiet

- Seit Anfang September erhöhte Anzahl an Besamungen (ausgehend von Weser -Ems 2)
- Seit Mitte November leicht über „normalem“ Niveau

Veränderungen Anzahl Besamungen 2024 vs. 2023

Standort	Okt	Nov	Dez
BZW	+16%	+2%	+2%
Verden	+10%	+8%	+3%
Meißen	+4%	-2%	+1%
Gesamt	+10%	+5%	+3%

BZW=Bad Zwischenahn
(Oldenburg)

Verendete Kühe (prozentual zur Gesamtzahl gehaltener Kühe in Sachsen 2020-2024)

T\$K

SÄCHSISCHE
TIERSEUCHENKASSE
ANSTALT
DES ÖFFENTLICHEN
RECHTS

26.08.2024

Beispielbetrieb

- Mutterkuhherde, Charolais Herdbuch
- 80 Mutterkühe + Nachzucht, Vogtland
- Anfang September erste Symptome bei Kühen
- Mitte Dez. Beginn der Kalbesaison

- Blutproben von allen Kühen und Kälbern
- PCR-Virusnachweis, Antikörper-ELISA
- FLI Insel Riems, Dr. Hoffmann

Indirekter Nachweis (Antikörper)

BTV-Beispielbetrieb

positiv

negativ

BTV-Testbetrieb

tragende Kühe
zum Eintrieb
TU-
14%

Kälber verendet
mit
neurologischen
Symptomen
26%

Kälber lebend mit
neurologischen
Symptomen
6%

Kälber lebend zu früh (schlechter
Allgemeinzustand)
4%

impfen! , impfen!, impfen!

2 x geimpfte Rinder	89.025	
ungeimpfte Rinder	273.000	
	362.000	Rinder über 6 Monate

Impfungen beim Rind in Sachsen

Prophylaxe

Absolute Impfpflicht

| Impfpflicht STIKO-VET

- Die Impfung mit einer BTV-3 spezifischen Vakzine kann die Virämie bei Schafen und Rindern reduzieren und so Verluste, Symptomatik und Übertragung von Tier zu Tier/Vektor verringern.

Vektorkontrolle

- Insektizide
- Einstallung ?
- Lüfter laufen lassen !

Die Impfung der Wiederkäuer bietet derzeit den einzigen effektiven Schutz gegen die klinischen Symptome, Tierverluste und vor der Virusausbreitung!

- **Impfung senkt Virämie, Symptomatik, Mortalität**
- **Tiere vor Beginn der Gnitzensaison (April) impfen!**
- **Nichtgeimpfte Rinder schnellstens grundimmunisieren**

- **Boosterung, der im Sommer 2024 geimpften Tiere vor Austrieb**
- **Hineinimpfen in ein Infektionsgeschehen sinnvoll**

- **Impfwürdigkeit beachten, erkrankte Tiere Impfung nach Genesung nachholen**

- **3-4 Wochen bis der Impfschutz vollständig wirkt**

- **Rinder: Grundimmunisierung (2x), Schafe: Empfehlung: 2 Impfungen**

- **Impfstoffverfügbarkeit (verlängerte Gestattung, Zulassung)**

VIELEN DANK !

Auch an:
LUA Sachsen
prakt. TÄ
Rinder- und Schafhalter
FLI, Dr. Hoffmann

René Pützschel

Fachtierarzt für Rinder

Rindergesundheitsdienst

Nordsachsen, Meißen, Zwickau, Leipzig (Landkreis)
Erzgebirgskreis, Chemnitz

☎ 0351 8060872

📠 0171 4836074

Rindergesundheitsdienst und Bullengesundheitsdienst

Dr. Katrin Mayer

Fachtierärztin für öffentliches Veterinärwesen
Schaf- und Ziegengesundheitsdienst,
Bullengesundheitsdienst

T\$K
SÄCHSISCHE
TIERSEUCHENKASSE
ANSTALT
DES ÖFFENTLICHEN
RECHTS

Dr. Mandy Schmidt

Fachtierärztin für öffentliches Veterinärwesen

Rindergesundheitsdienst

Görlitz, Bautzen, Sächsische Schweiz Osterzgebirge, Dresden, Mittelsachsen

☎ 0351 8060819

📠 0170 2836753