Rinderseuchenüberwachung 2025

BVD, IBR/ IPV, Brucellose und Leukose

Bovine Virus Diarrhoe der Rinder & Mucosal Disease

- I Virale Infektion der Rinder mit einem Pestivirus
- I Transiente Infektion $\longrightarrow$ Immunes Tier
 - Lungenentzündungen, Abwehrschwäche; Absenken der Milchleistung, Durchfall, Aborte;
- I Infektion eines Muttertiers zw. 30. und 90. Tag der Trächtigkeit $\longrightarrow$ PI - Kalb
 - Massive Virusausscheidung; tödlicher Verlauf durch unstillbaren Durchfall

Bekämpfung und Sanierung der BVD Sachsen

- I Vor der obligatorischen Bekämpfung : Seroprävalenz von 60 – 90% in den dt. Rinderherden (2% PI)
- I 1998 erstmals "Leitlinien für den Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion mit BVD/ MD und für die Sanierung infizierter Bestände,, - > freiwillige Sanierung mittels Diagnose und Ausmerzung der PI – Tiere; Schutzimpfung
- I Ab 2004 Anzeigepflicht und 2011 Erlass der nationalen BVDV – Verordnung
- I Sachsen eigenes Landesprogramm mit der TSK seit
- I EU – Recht „gelisteten Seuchen“ (Kategorie C + D + E)
- I Seit April 2021 Impfverbot
- I Gewährung des Status „frei von BVD“ von Sachsen seit Februar 2022

Infektiöse bovine Rhinotracheitis (IBR) / Infektiöse pustulöse Vulvovaginitis (IPV)

- | Erreger ist das Bovine Herpes Virus 1 (BHV 1)
- | **IBR:**
 - | mild bis schwergradig verlaufende Infektion der oberen Atemwege;
 - | bei trächtigen Kühen -> Aborten
 - | Kälbern -> Enteritis oder Enzephalitis
- | **IPV/IPB**
 - | Bläschenausschläges im Genitalbereich
- | Infizierte Tiere sind lebenslang infiziert (Reagenten)

Sanierung der Rinderbestände in Sachsen

- | Anzeigepflichtige Tierseuche, nationale BHV 1- Verordnung
- | Sanierung über Impfverbot, Untersuchungspflicht und die Entfernung der Reagenten
- | Sachsen hat den Status „BHV 1 frei“ seit 2014
- | Letzter Ausbruch 2016 in Landkreis Leipzig Land

BHV – 1 Ausbrüche 2021 - 2024

Einzelfälle

Bundesland	Kreis	Seuchenobjekten...	Tierart	Kulturform	
Bayern	Ansbach	24-210-00019	JRd. 6-12 M. männl.	gehalten	
			JRd. 6-12 M. weibl.	gehalten	
			Kalb -6 Monate oder ~220 kg	gehalten	
			Rind 1-2 J.	gehalten	
			Rindv. >2 J.	gehalten	
			24-210-00022	Rind	gehalten
	Ansbach,Stadt		23-210-00007	Rind	gehalten
	Augsburg		22-210-00020	JRd. 6-12 M. weibl.	gehalten
	Dillingen a.d. Donau		22-210-00024	Mastrind	gehalten
	Donau-Ries		24-210-00014	Rind	gehalten
		24-210-00015	Mastrind	gehalten	
		24-210-00016	Mastrind	gehalten	
Günzburg		24-210-00017	Mastrind	gehalten	
		22-210-00021	Rind	gehalten	
		22-210-00023	Mastrind	gehalten	

Seuchenfälle

Chancen und Risiken durch Tilgung einer Tierseuche

- | Gesundere Rinderpopulation
- | Geringere tierärztliche Kosten
- | Erleichterte Handelsbedingungen
- | Bessere Diagnostik
- | Hohes Schutzbedürfnis bei einer naiven Rinderpopulation (BIOSICHERHEIT)
- | Schwere Krankheitsverläufe bei Neueinschleppung v.a. bei Verbringungen von Rindern
- | Weniger Kenntnisse über die Seuchen bei den Landwirten

Stabile Seuchenlage in Sachsen aber aktives Seuchengeschehen in anderen Bundesländern / Mitgliedsstaaten

Art des Untersuchungsverfahrens zur Überwachung

Auswahlkriterien betriebsindividuell abhängig vom:

- | Produktionsrichtung
- | serologischer Herdenstatus/ Impfstatus der zu überwachende Seuche
- | Bestandsgröße
- | MLP – Betrieb
- | Melksystem
- | BVD ob Ohrstanze oder serologische Überwachung

Derzeitige Überwachung

- I Basierend auf nationalen Tiergesundheitsgesetz und den nationalen Verordnungen
 - I Jedes Kalb wird mittels Ohrstanze auf BVD – Virus getestet
 - I Jede Kuh wird mindesten einmal pro Jahr serologisch auf BHV 1 untersucht

Überwachungskonzept nach AHL

- | Nachweis der **Erregerfreiheit**
- | **Früherkennung** eines Ausbruches
- | Mindestvorgaben in DeIVO (EU) 2020/689 zur Aufrechterhaltung des Tierseuchenstatus
- | Stichprobenverfahren für die BHV 1 auf Landesebene
- | Freiwilliges Stichprobenverfahren für die BVD auf Betriebsebene
- | Brucellose und Leukose zentrale Stichprobendiagnostik in der LUA

Untersuchungsintensität und -häufigkeit

I Nach Risikobeurteilung:

- ❖ Betriebe mit hohem Tierverkehr
- ❖ Verbringungen von Rindern aus Gebieten ohne Status (nicht frei)
- ❖ Betriebe mit hohem Transport- und Personenverkehr
- ❖ Betriebe mit mangelndem Hygienemanagement und Biosicherheit
- ❖ Umfangreiches Zusammentreffen von Rindern unterschiedlicher Herkunft, überdurchschnittliche Betriebsgröße und kurze Verweildauer im Betrieb

IBR / IPV

- | Art. 81 i.V.m Anhang IV Teil IV Kapitel 2 Abschnitt 2 (EU) 689/ 2020
- | Stichprobenverfahren mit einer Designprävalenz der rinderhaltenden Betriebe auf Landesebene von 0,2 % mit einer statistischen Sicherheit von 95 %
- | **1.337 Betriebe in Sachsen** jährlich untersucht
- | eine Kombination eines risiko- und zufallsbasierte Stichprobenverfahren
 - sind **alle Milchviehbetriebe**
 - Pseudoimpflinge können milchserologisch untersucht werden (CAVE HI-Tier Status!)
 - **737 andere Rinderhaltungen** in Sachsen
 - Auswahl → zuerst nach Risikofaktoren ([Siehe Folie 12](#))
→ der Rest per Zufallsverfahren

Landkreise und kreisfreie Städte	Anzahl Rinderhaltungen	Prozentualer Anteil der Rinderhaltungen	Anzahl der untersuchenden Rinderhaltungen außer Milchviehbetriebe
Leipzig, Stadt	24	0,4	3,0
Dresden, Stadt	55	0,85	6,0
Chemnitz, Stadt	66	1,02	8,0
Nordsachsen	401	6,18	47,0
Leipzig Land	443	6,83	50,0
Meißen	461	7,10	50,0
Görlitz	526	8,11	60,0
Vogtlandkreis	587	9,05	67,0
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	637	9,82	72,0
Zwickau	646	9,96	73,0
Bautzen	773	11,91	88,0
Erzgebirgskreis	861	13,27	98,0
Mittelsachsen	1.009	15,55	115,0
Sachen gesamt			737,0

Milchbetriebe

2x jährliche Stichprobe*)
1 x jährliche Stichprobe von 5% / 95%
(59 Tiere)
1 x jährliche Stichprobe von 20% / 95%
(14 Tiere)

Tankmilchbetrieb (Betriebe mit max. 120 Milchkühen)

2 x jährliche Tankmilch

2 x jährliche Einzelmilchstichprobe*) unter
Ausschluss der seropositiven Rinder in
der Untersuchungsgruppe (im Einzelfall
auch blutserologisch)

MVA >120 Milchkühe

2 x jährliche Einzelmilchstichprobe*)
unter Ausschluss der seropositiven
Rinder in der Untersuchungsgruppe (im
Einzelfall auch blutserologisch)

IBR / IPV

gemischte Betriebe < 30% lact. Tiere im Kuhanteil	1 x jährliche Stichprobe von 10% Zielprävalenz / 95% Sicherheit nach Risikobeurteilung vom LÜVA unter Beachtung des serologisch-neg. BHV 1-Einzeltierstatus
Mutterkuhbetriebe	1x jährlich innerbetrieblichen Zufallsstichprobe (10% Zielprävalenz/ 95% Sicherheit /29 Tiere) nach Risikobeurteilung des LÜVAs
Spezialisierte Jungtieraufzuchten (Fresser- und Färsenaufzuchten)	mittels einer 2x jährlichen innerbetrieblichen Zufallsstichprobe (20% Zielprävalenz/ 95% Sicherheit)
Mastbetriebe	nach Risikobeurteilung LÜVA

BVD Überwachung in Sachsen

- | Art. 41 Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. dem Art. 81 Verordnung (EU) 689/2020
- | BVD Anhang IV Teil VI Kapitel 2 Abschnitt 2 DeIVO (EU) 689/2020
- | Ohrstanzuntersuchung oder serologische Überwachung
- | zweistufiges Verfahren zur Umstellung auf ein serologisches Überwachungsprogramm
- | serologische Stichprobenverfahren → Phase I „Feststellung eines stabilen negativen Herdenstatus“ abgeschlossen ist
- | Erlass des SMS und die AV der LDS Überwachung der Aufrechterhaltung des Status "frei von Boviner Virus Diarrhoe (BVD)"/Umstellung auf die serologische Überwachung der sächsischen Rinderbestände – Phase 1 vom 30. Juni 2023
- | **Alle Rinderhaltende Betriebe sind in Sachsen zu überwachen**

Serologische BVD Überwachung

Milchbetriebe

4 x jährliche Stichprobe*)
1 x jährliche Stichprobe von 5% / 95%
3 x jährliche Stichprobe von 20% / 95%

Betriebe mit max. 120 laktierenden Milchkühen (potentieller Tankmilchbetrieb)

4 x jährliche Tankmilchprobe

4 x jährliche Einzelmilchstichprobe*) unter
Ausschluss bekannt seropositiver Rinder
in der Untersuchungsgruppe (im Einzelfall
auch blutserologisch)

MVA >120 Milchkühe

4 x jährliche Einzelmilchstichprobe*)
unter Ausschluss bekannt seropositiver
Rinder in der Untersuchungsgruppe (im
Einzelfall auch blutserologisch)

Serologische BVD Überwachung

**gemischte Betriebe mit < 30%
laktierende Tiere im Kuhanteil**

Stichprobenuntersuchung nach Risikobeurteilung vom LÜVA unter Beachtung des serologisch-neg. BVD-Einzeltierstatus

Mutterkuhbetriebe

1 x jährliche Stichprobe von 10% Zielprävalenz / 95% Sicherheit nach Risikobeurteilung vom LÜVA unter Ausschluss bekannt seropositiver Rinder in der Untersuchungsgruppe (im Einzelfall auch blutserologisch)

**Spezialisierte Jungtieraufzuchten
(Fresser- und Färsenaufzuchten)**

mittels einer 2x jährlichen innerbetrieblichen Zufallsstichprobe (20% Zielprävalenz/ 95% Sicherheit)

Mastbetriebe

nach Risikobeurteilung LÜVA

Überwachung der Brucellose und Leukose

- | Nachweis der Seuchenfreiheit auf Grundlage einer zufallsbasierten Stichprobe von 0,1 % Zielprävalenz der Rinderpopulation von Deutschland
- | Jährliche Stichprobe von 3000 Untersuchungen in der LUA
- | Separate Probennahme für diese Tests sind entbehrlich
- | Abortuntersuchungen auf Brucellose bei erhöhten Abortgeschehen im Betrieb
 - | Nutzung des Abortprogramms der TSK

FAZIT

Die Rinderseuchenüberwachung für IBR/ IPV (BHV 1), BVD, Brucellose und Leukose wird ab 2025 für Sachsen neu geregelt:

- | IBR/ IPV (früher BHV 1) muss außer den Milchviehbetrieben nur noch nach Anordnung des zuständigen LÜVA untersucht werden
- | Milchviehbetriebe können weiterhin kostenneutral ihre Kühe über den LKV im Rahmen der GERO – Prüfung mit untersuchen lassen
- | Kleine Milchviehbetriebe mit unter 120 Milchkühen können die Tankmilch über die Rohmilchgüteprüfungsprobe der Molkereien nutzen
- | BVD Ohrstanzdiagnostik in der LUA wird weiterhin vom Freistaat Sachsen bezahlt
- | Freiwillige Umstellung auf eine serologische Überwachung der BVD gemäß der [Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen](#) für alle Betriebe möglich
- | Probennahme für die Untersuchung auf Brucellose und Leukose entfällt